



Ministério da  
Ciência e Tecnologia



INPE-15397-PUD/202

## TERREMOTO ATINGE ESTADOS DO SUDESTE E SUL DO BRASIL NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008

Marco Antonio Fontoura Hansen  
Tania Maria Sausen  
Manoel de Araújo Sousa Júnior  
Silvia Midori Saito  
Camila Cossetin Ferreira

Registro do documento original:

<<http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/08.24.13.28>>

INPE  
São José dos Campos  
2009

## SUMÁRIO

	<b>Pág.</b>
<b>1 O QUE É UM ABALO SÍSMICO? .....</b>	<b>3</b>
<b>2 COMO OCORRE?.....</b>	<b>3</b>
<b>3 QUANDO OCORREU? .....</b>	<b>3</b>
<b>4 ONDE OCORREU? .....</b>	<b>5</b>
<b>5 COMO LOCALIZARAM O EVENTO?.....</b>	<b>6</b>
<b>6 POR QUE OCORREU?.....</b>	<b>6</b>
<b>7 ONDE OCORRERAM EVENTOS SÍSMICOS ANTERIORES MAIS INTENSOS NO BRASIL? .....</b>	<b>8</b>
<b>8 QUAIS SÃO AS DIFICULDADES NO PROGNÓSTICO DE ABALOS SÍSMICOS? .....</b>	<b>8</b>
<b>9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>9</b>

## **1 O QUE É UM ABALO SÍSMICO?**

São tremores que podem ocorrer tanto em terra quanto no mar. Podem ser naturais ou induzidos pelo Homem. Normalmente são de curta duração (alguns segundos), mas de intensidade imprevisível.

As movimentações são oriundas de colisões de grandes massas rochosas, que geram tremores ou abalos causados pela liberação repentina da energia acumulada, durante um determinado intervalo de tempo, que podem ser conhecidos como terremoto, quando de origem continental ou maremoto, quando associado às placas oceânicas. Os efeitos destes eventos ocasionam prejuízos financeiros com destruição às edificações e até perdas de vida. Como exemplo de sismos localizados, um de intensidade 4,9 °, na escala logarítmica de Richter, que varia de 0 a 9, ocorreu na comunidade rural de Caraíbas, em Itacarambi, Norte de Minas Gerais, no ano de 2007 provocando, além de danos materiais, o registro da primeira morte no Brasil por este tipo de evento.

## **2 COMO OCORRE?**

Para entender fenômenos desta natureza é preciso compreender alguns princípios geológicos básicos da Tectônica de Placas e da Deriva Continental.

O planeta Terra é subdividido internamente, de uma maneira simplificada, da superfície ao seu centro, em crostas Oceânica e Continental formadoras da Litosfera Terrestre, mantos Superior e Inferior e núcleos Externo e Interno (Figura 1).

As placas continentais e as oceânicas estão direta ou indiretamente conectadas e se deslocam sobre o manto magmático com características fluidas. Estas se movem a uma velocidade que varia de 2 a 18 cm por ano, em termos análogos, compara-se a barcos amarrados, boiando sobre um “mar de magma”, por isto, toda ação corresponde a uma reação. As placas continentais e oceânicas, além de apresentarem uma deriva (movimentos horizontais) possuem deslocamentos verticais e subverticais manifestos pelas celas de convecção do magma e influenciadas também pelas marés terrestres (ação gravitacional, principalmente pela Lua-Terra).




Figura 1: Estruturação simplificada do interior da Terra.  
 Fonte: Adaptada de <http://www.ofitexto.com.br/nacrateradokaala/terra.gif>

No caso das células convectivas trata-se de um princípio físico, no qual as massas de magma quente sobem sob as crostas terrestre e oceânica e ao se resfriarem pelo contato com esta descem ocasionando o movimento das placas entre si (Figura 2). A astenosfera é a zona do Manto Superior onde o magma apresenta comportamento plástico.




Figura 2: Desenho esquemático sobre o movimento das placas que constituem as crostas oceânica e continental.  
 Fonte: Adaptada de <http://www.igc.usp.br/geologia/imagens/fig5.gif> apud Wyllie (1976)

Os abalos sísmicos de maior intensidade e frequência estão na periferia das placas tectônicas.





Figura 4: Localização do epicentro e projeção da propagação das ondas sísmicas.

Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u394713.shtml> apud USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos)

## 5 COMO LOCALIZARAM O EVENTO?

O posicionamento do **hipocentro** (local de origem), a, aproximadamente, 10 km de profundidade do **epicentro** foi medido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e também pela Universidade Nacional de Brasília (UNB).

Os tremores foram registrados em sismogramas, por um aparelho denominado de sismógrafo.

Os sísmos provocados por um abalo se propagam com diferentes comprimentos de ondas, em todas as direções. Existem basicamente quatro tipos de ondas (**P**rimária, **S**ecundária, **L**ove, **R**ayleigh) que chegam aos registradores com distintas velocidades, que permitem por meio de triangulação localizar a fonte superficial do terremoto ou maremoto denominado de epicentro, assim como do hipocentro. Como os Estados Unidos possui uma ampla rede de sismógrafos foi possível com rapidez localizar o evento ocorrido.

## 6 POR QUE OCORREU?

Neste local situa-se uma das várias falhas transformantes perpendiculares à Cordilheira Meso-Oceânica Atlântica resultante da separação das placas Sul-Americana e Africana.

Estas placas estão constantemente se expandindo, com movimentos laterais opostos entre si, que dependente dos esforços ocasionam reativações de antigos lineamentos tectônicos (Figura 5).




Figura 5: Desenho esquemático das falhas transformantes, no oceano Atlântico, entre Brasil e África perpendiculares a Cordilheira Meso-Oceânica. Em vermelho, local aproximado de ocorrência do abalo sísmico do dia 22/04/2008 e área de abrangência. Latitude: 22°38'24,42" S e Longitude: 45°11'11,03" O, pelo Datum WGS 84.  
 Fonte: Adaptada de [http://www.galeria.blogs.sapo.pt/.../Oceano\\_Atlantico.jpg](http://www.galeria.blogs.sapo.pt/.../Oceano_Atlantico.jpg)

Quando ocorrem estas acomodações há uma liberação de energia que provoca abalos. Quanto maior a distância das bordas das placas tectônicas menos intensos e freqüentes são os tremores e, normalmente, de baixa duração.

O **hipocentro** (foco de origem) deste terremoto se situou próximo a um lineamento com montes submarinos que chega ao limite do Talude com a Plataforma Continental, a 10 km de profundidade. A figura 6 exemplifica esquematicamente o posicionamento espacial entre epicentro e hipocentro.




Figura 6: Esquema exemplificando a situação do epicentro e hipocentro ou foco de um terremoto por falhas transformantes.

Fonte: adaptada de [http://www.funvisis.gob.ve/imagenes/fotos\\_varias/epicentro.jpg](http://www.funvisis.gob.ve/imagenes/fotos_varias/epicentro.jpg)

Este recente tremor ocorrido no Estado São Paulo se propagou radialmente a partir do epicentro atingindo outros estados. A sua magnitude foi de 5,2 ° na escala Richter, segundo os estudos anteriores está entre os maiores já ocorridos no Brasil.

## **7 ONDE OCORRERAM EVENTOS SÍSMICOS ANTERIORES MAIS INTENSOS NO BRASIL?**

Os abalos sísmicos de menor magnitude 2 ° a 4 ° ocorrem diariamente no Brasil, porém são imperceptíveis pelo ser humano, mas são detectados em média 10 tremores por dia, através dos sismógrafos, adaptado de:

<http://revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=2055&bd=1&pg=1&lg=>.

O maior de todos os terremotos registrados no Brasil foi no Estado do Mato Grosso, em 1955, com 6,6 ° de magnitude e no mesmo ano, no litoral do Estado do Espírito Santo ocorreu outro com 6,3 ° de magnitude, possivelmente, este último sobre o lineamento tectônico Vitória-Trindade (vide figura 5).

São Paulo, em outras ocasiões, já sofreu abalos sísmicos resultantes de terremotos ocorridos no Chile, Bolívia e de outros locais, pela liberação de energia fruto das tensões ocorrentes intra-placa, assim como, vários outros próximos à costa, desde o litoral do Espírito Santo até as imediações da porção central do Estado do Rio Grande do Sul resultantes, possivelmente, da reativação de falhas transformantes.

## **8 QUAIS SÃO AS DIFICULDADES NO PROGNÓSTICO DE ABALOS SÍSMICOS?**

O Brasil é extremamente pobre em estações sismográficas.

A IDF (**I**ntensidade, **D**uração e **F**requência) é de difícil previsão, pois as variáveis envolvidas são muitas.

Há necessidade urgente de se implantar uma rede nacional e ampliar este horizonte de conhecimento geocientífico.

Portanto, a previsão deste tipo de fenômeno é de difícil mensuração pelas variáveis aleatórias que atuam em eventos desta natureza.

## 9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ZIMBRES, Eurico. **Dicionário Livre de Geociências**. Departamento de Geologia. UERJ. Disponível em

<[http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Imagem:Tectonic\\_plates\\_movement\\_pt\\_BR.jpg](http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Imagem:Tectonic_plates_movement_pt_BR.jpg)>. Acesso em: 25 abr 2008.

FOLHA *ON LINE*. Cotidiano. **Terremoto de 5,2 graus da escala Richter atinge ao menos quatro estados**. Disponível em

<<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u394713.shtml>>. Acesso em: 26 abr 2008.

GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA. **Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas**. Disponível em

< [http://www.funvisis.gob.ve/imagenes/fotos\\_varias/epicentro.jpg](http://www.funvisis.gob.ve/imagenes/fotos_varias/epicentro.jpg)> . Acesso em 30 abr 2008.

BLOG. **Galeria**. Disponível em

<[http://www.galeria.blogs.sapo.pt/.../Oceano\\_Atlantico.jpg](http://www.galeria.blogs.sapo.pt/.../Oceano_Atlantico.jpg)>. Acesso em: 30 abr 2008

GEOCIÊNCIAS. **Enciclopédia**. USP. Disponível em

<<http://www.igc.usp.br/geologia/imagens/fig5.gif>>. Acesso em 30 abr 2008

NA CRATERA DO KAALA SITE DO EDUCADOR. **2. Vulcanismo, Atmosfera e Clima**. Disponível em

<<http://www.ofitexto.com.br/nacrateradokaala/terra.gif>>. Acesso em: 29 abr 2008.

PESQUISA FAPESP *ON LINE*. Disponível em  
<<http://revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=2055&bd=1&pg=1&lg=>>>. Acesso em: 22 abr. 2008.